

## INFORMACIÓN PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

### SUBDIRECCIÓN DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS BIOLÓGICOS – GRUPO DE FARMACOVIGILANCIA.

#### SAXAGLIPTINA

Por reportes de farmacovigilancia post-comercialización asociados a reacciones de hipersensibilidad (angioedema, anafilaxia) y pancreatitis aguda con el uso de Saxagliptina, el titular de la molécula (Bristol-Myers Squibb) ha publicado información de seguridad sobre el principio activo en la página de la Agencia de Medicamentos y Productos para el Cuidado de la Salud del Reino Unido (MHRA por sus siglas en inglés).

En el comunicado se contraindica el uso de Saxagliptina en pacientes con estos antecedentes y que presenten alguna hipersensibilidad con cualquier inhibidor de la Dipeptidilpeptidasa 4 (DPP4).

Según lo anterior estas son las recomendaciones para profesionales de la salud propuestas por el INVIMA:

- Se recomienda a los profesionales de la salud que cuando se presenten sospechas de reacciones de hipersensibilidad por uso de Saxagliptina suspender inmediatamente el tratamiento con este medicamento.
- Se recomienda informar a los pacientes en terapia con Saxagliptina acerca de los síntomas de pancreatitis aguda.
- Se recomienda a los profesionales de la salud que cuando se presenten sospechas de pancreatitis aguda por uso de Saxagliptina suspender inmediatamente el tratamiento con este medicamento.

*Fuente: MHRA Información de seguridad para Profesionales de la salud. Abril 2012.*

<http://www.mhra.gov.uk/Safetyinformation/Safetywarningsalertsandrecalls/Safetywarningsandmessagesfor/medicines/Monthlylistsofinformationforhealthcareprofessionalsoonthesafetyofmedicines/CON146914>