

Lea todo el prospecto detenidamente antes de empezar a usar el medicamento.

- Conserve este prospecto. Puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico o farmacéutico.
- Este medicamento se le ha recetado a Usted personalmente y no debe darlo a otras personas. Puede perjudicarles, aun cuando sus síntomas sean los mismos que los suyos.

En este prospecto:

1. Qué es EBERNET 1% crema y para qué se utiliza
2. Antes de usar EBERNET 1% crema
3. Cómo usar EBERNET 1% crema
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de EBERNET 1% crema

EBERNET 1% crema

Eberconazol

El principio activo es eberconazol. Cada gramo de crema contiene 10 mg (como nitrato).
Los excipientes son: parahidroxibenzoato de metilo, alcohol cetosteárico, ésteres poliglicólicos de ácidos grasos C₁₂-C₂₀, oleato de decilo, propilenglicol, glicerina formaldehído, glicerol, poliacrilamida, trolamina y agua purificada.

El titular y responsable de la fabricación es:

Laboratorios SALVAT, S.A.
C/. Gall, 30-36
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)
ESPAÑA

1. QUÉ ES EBERNET 1% crema Y PARA QUÉ SE UTILIZA

EBERNET 1% crema se presenta en tubos de 15 gramos y 30 gramos para uso cutáneo.

Eberconazol pertenece a un grupo de medicamentos antifúngicos conocidos como derivados imidazólicos.

EBERNET 1% crema está indicado en el tratamiento cutáneo de las siguientes infecciones causadas por hongos: *Tinea corporis*, *Tinea cruris* y *Tinea pedis*.

2. ANTES DE USAR EBERNET 1% crema**No utilice EBERNET 1% crema:**

- Si es Vd. alérgico a eberconazol, a otros antifúngicos de la misma clase o a cualquier otro componente de este medicamento.

Tenga especial cuidado con EBERNET 1% crema:

- Si al aplicar la crema, ésta entra en contacto con los ojos, lávelos con agua abundante.
- Si presenta irritación cutánea tras el empleo de la crema; en este caso consulte a su médico.

No utilice vendajes que no dejen transpirar la zona infectada ya que podría aumentar la irritación de la piel. No aplique EBERNET 1% crema sobre mucosas.

Embarazo y lactancia

Consulte a su médico o farmacéutico antes de usar un medicamento.

Su médico establecerá en su caso particular, la conveniencia de usar este medicamento durante el embarazo o la lactancia.

Conducción y uso de máquinas

El uso de EBERNET 1% crema no altera la capacidad para conducir vehículos o utilizar maquinaria.

Información importante sobre algunos componentes de EBERNET 1% crema:

Este medicamento contiene parahidroxibenzoato de metilo por lo que puede causar reacciones alérgicas (posiblemente retardadas). Por contener propilenglicol, este medicamento puede causar irritación cutánea.

Uso con otros medicamentos:

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, o ha tomado recientemente cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta médica.

No utilice EBERNET 1% crema con otros preparados de uso cutáneo sin consultar a su médico o farmacéutico.

3. CÓMO USAR EBERNET 1% crema

Siga estas instrucciones a menos que su médico le haya dado otras indicaciones distintas. Recuerde aplicar su medicamento.

EBERNET 1% crema es un medicamento de uso cutáneo.

Adultos

EBERNET 1% crema debe aplicarse dos veces al día durante 4 semanas. La crema se aplicará en cantidad suficiente para cubrir la lesión y alrededores, y se repartirá con la ayuda de un ligero masaje. En lesiones localizadas en pliegues de la piel, se aplicará una pequeña cantidad de crema para evitar la maceración de la piel.

Es necesario cerrar bien el tubo después de cada aplicación.

Se recomienda mantener una higiene adecuada para prevenir la posibilidad de una nueva infección.

Su médico le indicará la duración del tratamiento con EBERNET 1% crema. No suspenda el tratamiento antes ya que podría volver a reproducirse la infección. En caso de no observarse mejoría clínica después de 4 semanas, consulte a su médico.

Insuficiencia renal y hepática:

No se precisa ajuste de dosis.

Si Vd. ha usado más EBERNET 1% crema del que debiera o si se ha ingerido el producto accidentalmente, consulte a su médico o farmacéutico.

Si olvidó utilizar EBERNET 1% crema:

Si ha olvidado una administración, aplíquese la crema tan pronto como lo recuerde. Si queda poco para la aplicación siguiente, espere hasta entonces. No use doble cantidad de crema para compensar la aplicación perdida.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Como todos los medicamentos, EBERNET 1% crema puede tener efectos adversos. Los más habituales son de carácter leve y transitorio y se producen a nivel de la piel, en la zona de aplicación. Se han descrito los siguientes efectos adversos de forma frecuente: enrojecimiento y picor. También se han descrito, de forma poco frecuente, los siguientes efectos: eczema, descamación de la piel, folliculitis (inflamación de los folículos) y pústulas.

Si observa cualquier otra reacción no descrita en este prospecto, consulte con su médico o farmacéutico.

5. CONSERVACIÓN DE EBERNET 1% crema

Mantenga EBERNET 1% crema fuera del alcance y de la vista de los niños.

No conservar a temperatura superior a 30°C.

Caducidad

No utilizar EBERNET 1% crema después de la fecha de caducidad.



SALVAT

LABORATORIOS SALVAT, S.A.
Gall, 30-36. 08950 Esplugues de Llobregat
BARCELONA - ESPAÑA